



CENTRO POLIDIAGNOSTICO
DR. I BOSSA E MARSICO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

PRESCRIZIONE ANGIO-TC ARTI INFERIORI

- CODICE: 88012.001 – TC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO (grandi vasi addominali)
- CODICE: 88014.001 – ANGIO TC DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO
- CODICE: 88387.003 – ANGIO TC FEMORE E ARTICOLAZIONE COXO- FEMORALE DX (SENZA E CON MDC)
- CODICE: 88387.004 – ANGIO TC FEMORE E ARTICOLAZIONE COXO- FEMORALE SIN (SENZA E CON MDC)
- CODICE: 88387.005 – ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA DX (SENZA E CON MDC)
- CODICE: 88387.006 – ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA SIN (SENZA E CON MDC)
- CODICE: 88387.001 – ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE DX (SENZA E CON MDC)
- CODICE: 88387.002 – ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE SIN (SENZA E CON MDC)

Indicazione Clinica all'esame: valutazione vasi arteriosi arti inferiori

Osservare il digiuno e portare tutti gli esami standard pre-contrastografici ed eseguire eventuale terapia desensibilizzante come per gli altri esami con mezzo di contrasto e.v. N.B.: coloro che assumono ipoglicemizzanti a base di metformina, dopo consulto con il Curante/Diabetologo, devono sospendere l'assunzione degli stessi per 48 ore prima dall'iniezione del mezzo di contrasto iodato e per 48 ore dopo l'iniezione dello stesso per la rara incidenza di severa acidosi lattica post-contrasto. Il Curante/Diabetologo valuteranno la sostituzione, per il periodo indicato, dei farmaci a base di metformina con farmaci che svolgono una funzione simile. Terapia desensibilizzante pre-mdc e.v. in caso di allergie avvenute anche una sola volta nel corso della vita: Cetirizina 10mg, Ranitidina 300mg, Metilprednisolone 16mg, mattina e sera iniziando 3gg prima dell'esame e da eseguire anche la mattina dell'esame (la mattina dell'esame assumere i farmaci a digiuno). N.B.: prima dell'assunzione dei farmaci desensibilizzanti bisogna sottoporre la terapia al Curante per valutare una eventuale ipersensibilità agli stessi. I principi attivi di cui sopra, in particolare la Cetirizina e la Ranitidina, non sono richiesti per la loro funzione di protezione gastrica e quindi non devono essere sostituiti con inibitori di pompa protonica in quanto questi ultimi non hanno effetto sui recettori H1 e H2.

Da riportare ad ogni controllo

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

Via Cesare Battisti, 62 - Tel. e Fax 081.8824044 - Tel. 081.8812784
80059 Torre del Greco (NA) - P. IVA 0130 1691 216 - C. F. 0368 7080 634
Provvisoriamente Accreditato

CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA

C.so Vittorio Emanuele, 149 - Tel. 081.3580152
80059 Torre del Greco (NA)
Provvisoriamente Accreditato